

Mag u wel of niet meerijden?

Deze beslisboom geldt voor alle klanten van Trevvel Samen en Trevvel Route (leerlingenvervoer uitgezonderd) en is inhoudelijk afgestemd met het RIVM.

Heeft u één of meer van de volgende klachten?

- Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
- Benauwdheid
- Hoesten
- Verhoging tot 38° Celsius of koorts
- Plotseling verlies van reuk of smaak

Bron: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19>

ja**nee**

Laat u testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Dit geldt ook voor mensen met cruciale beroepen of die werken in vitale processen.

Blijkt uit de test dat u besmet bent met het coronavirus?

Bron: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte>

ja**nee**

U mag niet meerijden met Trevvel tot u 10 dagen in quarantaine bent geweest en minimaal 24 uur klachtenvrij bent. Wij wensen u veel beterschap en hopen u gauw weer te ontmoeten in onze voertuigen.

Bron: <https://lci.rivm.nl/informatiepatienthuis>

Woont u met iemand die koorts heeft en/of het benauwd heeft?

ja**nee**

Uw huisgenoot kan zich laten testen. Het hele gezin/huishouden moet thuisblijven tot de uitslag van de test bekend is.

Blijkt uit de test dat uw huisgenoot besmet is met het coronavirus?

Bron: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte>

ja**nee**

Blijf thuis! U moet 10 dagen in quarantaine (na het laatste contactmoment of na terugkomst uit een risicogebied).

Bron: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte>

Weet u dat u in nauw* contact bent geweest met iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld?

ja**nee**

Bent u in een land/gebied geweest met een oranje/rood reisadvies*** (risicogebied)?

ja**nee**

U mag gewoon meerijden.

Aanvullende informatie

* Definitie contacten

Contacten worden onderscheiden in drie categorieën: 1. huisgenoten, 2. overige nauwe contacten en 3. overige contacten. Het gaat hierbij altijd om contact in de besmettelijke periode. Deze start 2 dagen voordat de klachten zijn begonnen en loopt door tot 24 uur na de laatste klachten (en minimaal 7 dagen na de eerste klachten).

1. Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt.
2. Overige nauwe contacten zijn personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens de besmettelijke periode. In omstandigheden waarbij er een zogenaamde hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als 'overig nauw contact' beschouwd.
3. Overige (niet nauwe) contacten zijn personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hadden met de patiënt op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen.

Bron: <https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco>

Actuele informatie over landen die zijn aangemerkt als COVID-19-risicogebied is beschikbaar via de volgende websites:

<https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland>

<https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen>

** Definitie verminderde weerstand

Volwassenen met bepaalde onderliggende aandoeningen hebben ook een groter risico op een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat om (één van) de volgende aandoeningen:

- Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een longarts zijn.
- Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een grieprik.
- Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
- Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.
- Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
- Mensen met een hiv humaan immunodeficientievirus-infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm².
- Mensen met ernstige leverziekte.
- Mensen met zeer ernstig overgewicht.

Bron: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen>



**samen staan
we sterk**